лыжах способствует повышению функциональных возможностей, закаливают его, укрепляют здоровье и приобщают будущего специалиста к ценностям физической культуры.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ С НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЬШИХ ГРУПП МЫШЦ

Терешкин Анатолий Федорович,
Кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный профессионально-педагогический
Университет
г. Екатеринбург

Аннотация. Исследовалась биоэлектрическая активность мышц у мальчиков 10 и 13 лет, при выполнении двух видов статических упражнений с напряжением больших групп мышц. Показано что двигательный аппарат детей и подростков недостаточно приспособлен к выполнению статических упражнений до отказа. В то же время дозированные по времени статические упражнения вызывают вполне адекватные реакции как двигательной функции, так систем кровообращение, дыхания в обеих возрастных группах. Это позволяет рекомендовать данные статические упражнения для применения на занятиях по физической культуры.

Ключевые слова. Статическое напряжение, испытуемый, двигательный аппарат, утомление, электромиографическую, рекрутирование, биоэлектрическая активность мышц.

Abstract. Bioelectric activity of muscles at boys of 10 and 13 years was investigated, at performance of two types of static exercises with tension of big groups of muscles. It is shown that the impellent device of children and teenagers is insufficiently adapted for performance of static exercises to the full. At the same time the static exercises dosed out on time cause quite proper responses as impellent function, so systems blood circulation, breath in both age groups. It allows to recommend these static exercises for application on occupations on physical culture.

Index terms. Static stress, examinee, impellent device, exhaustion, elektromiografichesky, rekrutirovaniye, bioelectric activity of muscles.

При физиологических исследованиях статических напряжений значительную информацию о состоянии двигательного аппарата можно получить, используя электромиографическую методику. Так, по данным электромиограммы можно судить о степени мышечного напряжения. При длительных статических нагрузках изменение биоэлектрической активности мышц (БЭАМ) в сочетании с другими физиологическими показателями позволяет выявить начальные признаки и развившееся утомление. Целью настоящей работы являлось изучение электромиографической характеристики физических упражнений, выполняемых детьми и подростками в изометрическом режиме, а также выяснение взаимодействия двигательной и вегетативной функций во время работы.

Исследовались мальчики 10-13 лет учащиеся общеобразовательных школ. Испытуемые выполняли два вида статических упражнений с напряжением больших групп мышц (в положении сидя с усилием 70% от максимального и в положении лежа с удержанием веса тела). В первом упражнении испытуемый садился на пол

лицом к гимнастической стенке, вытянутыми руками брался за ручки динамометра, сгибал ноги в коленях и опирался серединой стопы на нижнюю рейку. Разгибанием ног создавалось усилие, равное 70% от максимального, которое в одном случае удерживалось от отказа, а в другом три раза по 6 секунд с 10ти секундным интервалом отдыха между напряжениями.

Второе упражнение школьники выполняли, опираясь бедрами поперек гимнастической скамейки лицом вниз, ноги закреплялись под рейку гимнастической стенки, руки за голову, тело располагалось параллельно полу. В одном случае это поза удерживалась до отказа от работы, а в другом продолжительность удержания веса тела составляла 70% от максимального времени.

Обе нагрузки легко дозировались по времени, оказывали общее воздействие на организм испытуемых и позволяли регистрировать комплекс физиологических по-казателей во время работы.

БЭАМ регистрировалась на двухканальном электромиографе «MEDICOR» с чувствительностью 30мкВ/мм. Отведение биотоков с двуглавой мышцы плеча, двуглавой мышцы задней поверхности бедра и широчайшей мышцы спины осуществлялось с помощью поверхностных серебряных электродов. Электромиограмма регистрировалась на всем протяжении статического усилия одновременно с такими показателями кровообращения и дыхания, которые давали представление об изменении минутного объема крови (МОК), минутного объема дыхания (МОД), потребления кислорода. Изменение БЭАМ анализировалось по частоте и амплитуде осцилляций и суммарной биоэлектрической активности.

При выполнении статического упражнения в положении сидя до отказа, которое у детей длилось 17 секунд, у подростков 25 секунд, БЭАМ непрерывно возрастала. К концу работы этот показатель превышал начальную величину у детей 36,5% (P<0,001), у подростков на 48,6% (P<0,001). Наряду с однонаправленным характером сдвигов этого показателя между возрастными группами имелись существенные отличия по длительности периода рекрутирования двигательных единиц (Р<0,001). Если у младших школьников такой период составлял 176 мс, то у подростков только 149мс, что указывало на более совершенные механизмы регуляции мышечной деятельности в пубертатном возрасте. Непрерывное повышение БЭАМ до конца статической нагрузки свидетельствовало об увеличении числа возбужденных нейромоторных единиц, необходимых для выполнения заданного мышечного усилия. Синхронизация возбуждения мышечных волокон одно из необходимых условий поддержания нормальной работоспособности. Во время выполнения статического напряжения, по-видимому, возникало доминирующее возбуждение в двигательной зоне коры больших полушарий, и происходило сопряженное торможение нервных центров, отвечающих за функционирование вегетативных систем, которое выражалось в недостаточном увеличении МОК, МОД и потребления кислорода для энергообеспечения работающего организма. Подобные изменения при статических усилиях отмечены у взрослых нетренированных людей.

При статической нагрузке в положении сидя, дозированной по времени (трехкратные статические напряжения по 6с), БЭАМ уменьшилась от первого статического напряжения к третьему. Очевидно, кратковременный режим работы и отдых между статическими усилиями способствовало выбору оптимального количества мышечных групп для участия в последующей работе за счет координации деятельности нейромоторных единиц. У детей и подростков уровень БЭАМ на всех трех этапах был ниже, чем при нагрузке, выполняемой до отказа. По рекрутированию двигательных единиц отмечены лишь возрастные отличия, существенной разницы между статическими напряжениями не обнаружено. Дозированные по времени мышечные усилия требовали меньшей мобилизации деятельности двигательного аппарата, а возбуждение, возникающее при этом в двигательной зоне, не являлось, по всей вероятности, фактором, ограничивающим развертывание функций кровообращение и дыхания.

В обеих возрастных группах БЭАМ и длительности усилия были тесно связаны с вегетативным обеспечением. Так, например, коэффициент корреляции БЭАМ с потреблением кислорода составил у детей 0,69 у подростков 0,63, а при нагрузке до отказа соответственно 0,11 и 0,14. Корреляция потребления кислорода с длительностью усилия при дозированной статической нагрузке у подростков была больше, чем у детей (0,74 и 0,65).

Во время выполнения статического упражнения в положении лежа до отказа мышечные напряжения способствовали активизации деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Однако, в отличие от нагрузки в положении сидя, показатели работоспособности двигательного аппарата были теснее связаны с вегетативным обеспечением, что свидетельствовало о большей адекватности такой нагрузки для организма школьников. Продолжительность выполнения данного упражнения составила у детей 71с, у подростков 91с.

Двигательная функция при статическом напряжении в положении лежа наряду со всеми исследованными физиологическими системами проходит начальную стадию приспособления к нагрузке. На это указывало постепенное повышение БЭАМ в обеих возрастных группах. Происходил поиск оптимального режима мышечной деятельности. При выполнении данного статического усилия, как и при нагрузке в положении сидя до отказа, у подростков наблюдалось более быстрое рекрутирование двигательных единиц (145мс), чем у детей (180мс).

Различия были существенными (P<0,001). Разновременность врабатывания вегетативных систем и двигательного аппарата вносила определенную дискоординацию в их деятельность, что подтверждали слабые корреляции БЭАМ с МОК, МОД, частотой и глубиной дыхательных движений. В дальнейшем БЭАМ достигала, повидимому, оптимальной величины, отражая соответствие напряжения мышц для поддержания позы, так как оставалась почти постоянной на протяжении периода относительно устойчивого состояния. Это мышечное усилие может поддерживаться длительное время в результате сменности в деятельности нейромоторных единиц, которая происходит в результате попеременного возбуждения двигательных нейронов нервных центров, связанных с той или иной мышечной группой.

При относительно устойчивом состоянии в обеих возрастных группах улучшались связи показателей работоспособности двигательного аппарата с энергообеспечением, характеризующие более адекватную реакцию организма на велечину и длительность статического усилия. Однако у детей взаимосвязи были выражены в меньшей степени. Это объясняет на наш взгляд, недостаточно тонкой координацией между центрами, необходимых для переключения нейромоторных единиц, что требует дополнительного функционального напряжения двигательного аппарата.

В дальнейшем выполнение статического упражнения сопровождалось обеих возрастных группах нарастающим утомлением, признаком которого являлись полифазные биотоки, свидетельствовавшие о замедлении проведения возбуждения в нервномышечном аппарате. Однако у мальчиков 10ти лет такие биотоки появлялись раньше, чем в 13ти летнем возрасте (55с и 69с, P0,001). Такая возрастная осо-

бенность указывала на повышение функциональной зрелости двигательного анализатора подростков. На этом этапе работы в обеих возрастных группах обнаружена высокая отрицательная корреляция МОК с систолическим объемом крови (-0,88 и - 0,85), ухудшалась эффективность внешнего дыхания, о чем свидетельствовала несущественная связь МОД с дыхательным объемом (0,24 и 0,49). Нарастающее утомление в своей начальной фазе сопровождалось статически значимым увеличением БЭАМ по отношению к периоду относительно устойчивого состояния у детей и подростков соответственно на 7,7% (P<0,05) и 7,6% (P<0,05).

Это можно объяснить следующим: для продолжения работы испытуемые должны были прилагать волевое усилие, которое требовало дополнительной мобилизации деятельности двигательного аппарата, связанного с еще большей синхронизацией возбуждения нейромоторных единиц. В работу вовлекались группы мышц, ранее не участвовавшие в ней. Такая двигательная деятельность способствовала нарушению установившихся межсистемных взаимосвязей.

В конечно фазе статической нагрузки в положении лежа до отказа в обеих возрастных группах происходило снижение БЭАМ по отношению к начальному периоду утомления, что являлось показателем особенно выраженного утомления. Происходила дальнешая дискоординация двигательного и вегетативного функционирования, и как следствие отказ от работы.

Статическая нагрузка в положении лежа. Дозированная по времени, отличалась от статического усилия до отказа тем, что исключалась возможность появления утомления. Знание о предстоящей более легкой работе вызывало у испытуемых меньше отрицательное влияние на функционирование вегетативных систем, особенно в период начального приспособления к статическому усилию. При дозированной нагрузке двигательный аппарат испытывал меньшее функциональное напряжение на всем протяжении работы. На этапе начального приспособления к статическому напряжению между нагрузками по данным БЭАМ имелись существенные отличия (P<0,001). Длительность периода рекрутирования двигательных единиц у детей и подростков была также несколько короче.

Вероятно, у испытуемых во время поиска оптимального режима мышечной деятельности при дозированном статическом усилии происходило более согласованное взаимодействие между центрами, вовлекающими в работ у нейромоторные единицы, тем самым ограничивались степень дополнительных мышечных усилий, снижались энерготраты организма и возможность нарушения центральнорегуляторных взаимосвязей вегетативных систем. Поэтому в обеих возрастных группах устанавливались положительные корреляции БЭАМ и длительности периода начального приспособления к дозированной нагрузке с МОК, МОД и потреблением кислорода, чего не было обнаружено в тот же период при статическом напряжении до отказа.

На этапе относительно устойчивого состояния при дозированном статическом напряжении, как и при нагрузке до отказа, БЭАМ поддерживалась почти на постоянном уровне. В то же время в обеих возрастных группах она была статически значимо ниже, чем при статическом усилии до отказа (P<0,001). В этом периоде дозированной нагрузке у детей и подростков регистрировались более тесные связи между двигательной функцией и показателями кровообращения и дыхания.

Систематическое использование статических упражнений, заключающихся в напряжении больших групп мышц дозированных по времени, на занятиях физической культуры, оказало заметное влияние на развитие двигательной функции у де-

тей и подростков. В обеих возрастных группах, где применялись статические напряжения, существенно возросла сила отдельных групп мышц, скоростно-силовые качества и статическая выносливость, особенно у подростков.

Следовательно, двигательный аппарат детей и подростков недостаточно приспособлен к выполнению статических упражнений с напряжением больших групп мышц до отказа. В то же время дозированные по времени статические упражнения вызывают вполне адекватные реакции как двигательной функции, так и систем кровообращения, дыхания в обеих возрастных группах, что позволяет рекомендовать данные статические упражнения для применения на занятиях по физической культуре.

Подростки отличаются от детей более зрелыми механизмами регуляции мышечной деятельности при срочной и долгосрочной адаптации к статическим напряжениям. В пубертатном возрасте во время нагрузки значительно быстрее происходит рекрутирование двигательных единиц, и позднее появляются полифазные биотоки. У подростков, в отличие от детей, при систематическом повышении статическом повышении статическом повышении статических упражнений в больше мере улучшается функционирование двигательного аппарата.

СМЫСЛО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЧНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Клеменчук Светлана Петровна старший преподаватель кафедры хореографии Ставропольского государственного педагогического института г. Ставрополь

Аннотация. Статья содержит теоретические материалы по проблеме освоения и исполнения пластичного двигательного действия. Использование смыслооринтированного проектирования позволит более глубоко изучить технологию пластичного двигательного действия, тем самым повысить уровень управления процесса формирования и совершенствования пластичных двигательных действий.

Ключевые слова: пластичное двигательное действие, смысловое проектирование, коннотация, смысло-ориентированное проектирование.

Abstract. Article includes theoretical material on the issue of the development and execution of a plastic motor actions. The use of semantic-orientation projection will further study the technology of plastic motor actions, thus increasing the level of control of the formation and improvement of the plastic motor actions.

Index terms: plastic motor actions, semantic projection, connotation, semantic-orientation projection.

Разрозненные представления о составляющей пластичного двигательного действия человеческого тела начали постепенно оформляться в эпоху Ренессанса. Перу Леонардо да Винчи (1452 – 1519) принадлежит одно из первых исследований по искусству движения — утерянный «Трактат о живописи и человеческих движениях».

Вопросами искусства пластичного движения занимались французский педагог Франсуа Дельсарт (1811 – 1871), физиолог и педагог Жорж Демени (1850 – 1917), профессор Женевской консерватории Жак Далькроз (1865 – 1914), танцовщица Айседора Дункан (1878 – 1927), хореограф Рудольф Лабан (1879 – 1958), наши отече-